

ANGIOTAC EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA C/ CONTRASTE

Preparación

- • Pacientes mayores a 50 años y/o diabéticos de cualquier edad deberán presentar examen de creatinina actualizado (máximo de 15 días de antigüedad).
- • Ayuno Mínimo de 4 horas.
- • Se debe suspender la Metformina por 24 horas antes y después del examen.
- • Dar aviso si hay riesgo de embarazo, o padece algunas de las siguientes patologías: insuficiencia renal, hipertiroidismo, o antecedentes alérgicos al medio de contraste (yodo).
- • Exámenes de ANGIOTAC/ANGIOGRAFIAS/ANGIOTOMOGRAFIA son siempre con contraste, por ende, seguir las instrucciones asociadas.
- • En caso de Scanner de Abdomen y pelvis, el paciente debe ingerir un litro de agua una hora antes del examen.
-
- Importante
- Sólo en caso de TC de cuello o TC cervical (NO Columna Cervical) siempre debe ser con contraste, aunque no esté indicado
- En pacientes asmáticos o alérgicos a medicamentos, el examen podría requerir de una premedicación extra que será evaluada durante el procedimiento (esto podría generar costos extra y tiempo mayor de espera).