

ANGIOTAC TORAX (AORTA TORAXICA) C/ CONTRASTE

Preparación

- Duración del examen: 20 minutos por paciente.
- TODO PACIENTE MAYOR DE 60 AÑOS QUE SERÁ SOMETIDO A ADMINISTRACIÓN DE MEDIOS DE CONTRASTE DEBE REALIZARSE EXAMEN DE CREATININA.
- Vigencia de Resultado de creatinina:
 - Ambulatorio: hasta 30 días previo a la toma de su examen o procedimiento
 - Hospitalizado y Urgencia: Del día en que se solicita el procedimiento o examen. Preparación del paciente para el examen
- Ayuno de 4 horas como mínimo.
- No fumar el día del examen.
- En caso de ser Pielotac o Urotac tener retención de orina.(a lo menos 2 horas) Posterior a la realización del scanner con contraste • Tomar abundante agua (3 lts en las siguientes 3 horas) para eliminar el medio de contraste lo más rápido del organismo.
- El paciente puede hacer su vida normal posterior a éste examen.
- Importante
 - El medio de contraste utilizado, es Ultravist, el que está hecho en base de yodo.
 - Los pacientes con hipersensibilidad al medio de contraste, no podrán realizarse en Nueva Clínica Cordillera, cualquier scanner que requiera de la administración de contraste.
 - Informe al personal de scanner, que le realizara el examen, sobre alergias especialmente a medicamentos, alteraciones de la coagulación, enfermedades crónicas (corazón, hígado, pulmón, diabetes, asma bronquial etc.) y de los medicamentos que ingiere. Especialmente los hipoglicemiantes (metformina, glibenclamida).
 - Paciente que presenten asma bronquial severa o con abandono de tratamiento deberán ser premedicados.