ANGIOTAC TORAX (TEP) C/ CONTRASTE

Preparación

- • Duración del examen: 20 minutos por paciente.
- • TODO PACIENTE MAYOR DE 60 AÑOS QUE SERÁ SOMETIDO A ADMINISTRACIÓN DE MEDIOS DE CONTRASTE DEBE REALIZARSE EXAMEN DE CREATININA.
-
- Vigencia de Resultado de creatinina:
- • Ambulatorio: hasta 30 días previo a la toma de su examen o procedimiento
- • Hospitalizado y Urgencia: Del día en que se solicita el procedimiento o examen. Preparación del paciente para el examen
-
- • Ayuno de 4 horas como mínimo.
- • No fumar el día del examen.
- • En caso de ser Pielotac o Urotac tener retención de orina.(a lo menos 2 horas) Posterior a la realización del scanner con contraste • Tomar abundante agua (3 lts en las siguientes 3 horas) para eliminar el medio de contraste lo más rápido del organismo.
- • El paciente puede hacer su vida normal posterior a éste examen.
-
- Importante
- • El medio de contraste utilizado, es Ultravist, el que está hecho en base de yodo.
- • Los pacientes con hipersensibilidad al medio de contraste, no podrán realizarse en Nueva Clínica Cordillera, cualquier scanner que requiera de la administración de contraste.
- • Informe al personal de scanner, que le realizara el examen, sobre alergias especialmente a medicamentos, alteraciones de la coagulación, enfermedades crónicas (corazón, hígado, pulmón, diabetes, asma bronquial etc.) y de los medicamentos que ingiere. Especialmente los hipoglicemiantes (metformina, glibenclamida).
- • Paciente que presenten asma bronquial severa o con abandono de tratamiento deberán ser premedicados.